



FERNANDA GARCÍA D.D.S

INDICACIONES POST-OPERATORIAS:

Le sugerimos seguir con las siguientes instrucciones, le ayudaran a evitar complicaciones y promover su pronta recuperación.

- ✓ Mantenga la gasa mordida con cierta presión por 15 minutos, luego deséchela.
- ✓ No se muerda ni pellizque el labio o mejilla de la zona anestesiada.
- ✓ Mantenga una dieta blanda durante el día de la cirugía.
- ✓ Realice una buena higiene bucal con cepillo suave y evite los enjuagues durante las 24 horas siguientes a la intervención.
- ✓ Evite fumar al menos 48 horas posteriores a la cirugía.
- ✓ La actividad física debe ser restringida durante las 24 a 48 horas posteriores a la cirugía.
- ✓ Es normal que se inflame, no se alarme. Para minimizar la inflamación debe aplicar compresas heladas en el sitio de la intervención durante las primeras 24 horas.
- ✓ La inflamación comenzara a disminuir después de 72 horas. Esto se puede favorecer aplicando fomentos húmedos calientes a partir del segundo día de la cirugía.
- ✓ Para aliviar el dolor y la inflamación tome los medicamentos prescritos de la forma indicada.
- ✓ Si se le prescribe un antibiótico, deberá tomarlo a la hora por el tiempo señalado, no suspenda el tratamiento aunque se sienta mejor.
- ✓ En caso de que se presente sangrado, comuníquese al consultorio de inmediato.

Próxima cita: _____